

CICINDÉLIDES ET CARABIDES INDO-CHINOIS REÇUEILLIS PAR M. PAVIE.
DIAGNOSES DES ESPÈCES NOUVELLES ET D'UN GENRE NOUVEAU,

PAR P. LESNE.

Durant ses longues explorations dans la péninsule indo-chinoise, M. Pavie, précédemment ministre plénipotentiaire de France au Siam, a recueilli une assez nombreuse série (80 espèces) de Coléoptères carnassiers terrestres (*Cicindelidae* et *Carabidae*) dont il a enrichi les collections entomologiques du Muséum.

Cette série comprenait environ 15 espèces non encore représentées dans nos collections et 12 espèces inédites, dont l'une a nécessité la création d'un genre nouveau. Citons rapidement les formes les plus intéressantes.

Parmi les Cicindélides, le genre *Collyris*, dont les nombreuses espèces sont localisées dans la région des deux péninsules sud-orientales de l'Asie et des îles de la Sonde, a fourni, dans les récoltes de M. Pavie, une espèce nouvelle (*C. similis* Lesne)⁽¹⁾, très voisine de *C. obscura* Cast., rapportée aussi par le même explorateur et dont nous avons établi à ce sujet la validité spécifique; un bel exemplaire d'une espèce de grande taille (*C. longicollis* F.) et un individu du *C. cruentata* Schm.-Geb., tous deux du Laos, sont venus aussi heureusement augmenter l'importante collection de *Collyris* du Muséum.

Dans la famille des Carabides, les *Ozæninæ*, aux caractères si tranchés, sont représentés par un *Pseudozæna* à facies propre (*P. spissicornis* Fairm.)⁽²⁾ dont la description originale a été rédigée d'après l'exemplaire capturé par M. Pavie. Parmi les *Scaritinae*, il faut citer une espèce nouvelle du curieux genre *Thlibops* (*T. Paviei n. sp.*) et quatre formes nouvelles du genre *Clivina* (*C. parallela*, *C. Julieni*, *C. alutacea*, *C. mekongensis n. sp.*). Parmi les *Chlaeniinæ*, mentionnons deux individus du *Chlaenius dilatatus* Motsch.; dans la tribu des *Oodinae*, un type générique nouveau (*Megaloodes n. g.*) remarquable par la conformation du dernier sternite apparent de l'abdomen et par la réduction du système des soies tactiles (*M. politus n. sp.*, de la région au Sud du Toulé-Sap); cette espèce avait été antérieurement rapportée du Siam par M. Bocourt. Dans la tribu des *Licininae*, un *Rhembus* de grande taille nouveau (*R. lœvis n. sp.*) que le Muséum possédait déjà de Bangkok et de Java. Les *Harpalinæ* ont fourni cinq espèces intéressantes pour les collections : *Platymetopus indochinensis* Bates, *Coleolissus (?) biseriatus n. sp.*, *Amblystomus fuscescens* Motsch., *Liodaptus birmanus* Bates, *L. longicornis n. sp.*, dont deux inédites; le genre *Liodaptus* n'était pas encore représenté au Muséum. Un ou deux *Stenolophus* sont aussi précieux pour les collections ainsi que le *Trigonotoma nitidicollis* Chaud., dans les

⁽¹⁾ *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1891, p. lv, et 1895, p. ccxii, f. II.

⁽²⁾ *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1888, p. 335.

Pterostichinæ. Enfin, parmi les *Brachininæ*, mentionnons un *Brachinus* inédit, *B. Paviei n. sp.*, voisin de *B. apicalis* Er. et de *B. exquisitus* Bates, et formant avec ces espèces, dans le genre *Brachinus*, un petit groupe spécial.




Fig. 1. — *Thlibops Paviei* Lesne.

1. ***Thlibops Paviei* n. sp.** — *Elongatus, subcylindricus, niger, sat nitidus. Caput supra grosse costatum, vertice laxe, clypeo antice bidentato. Prothorax elytris latior, elongatus, postice vix dilatatus, angulis antieis prominentibus. Pronotum toto impunctatum, sulco anteriori transversali multi-interrupto, longitudinali profundo, integro; impressionibus basalibus linearibus, vix impressis, lœvibus. Elytra prothorace sesquilonigiora, postice leviter dilatata, striis validissimis, obsolete punctatis, prope apicem lœvibus, interstitiis convexis, omnino impunctatis, 4° et 6° abbreriatis, 7° postice costiformi, 8° angustissimo. Corpus subtus omnino impunctatum (caput exceptum), segmento ultimo abdominis apice transversum sulcato. Long. 12 1/2 mill.*

Battambang (Siam cambodgien) (M. Pavie). — 1 individu.

Voisin du *T. crenatus* Chaud.

2. ***Clivina parallela* n. sp.** — *Elongata, parallela, subcylindrica, ferruginea, nitida. Caput supra irregulariter plicatum, impunctatum, sutura frontali indistincta. Clypeus truncatus, margine reflexo, angulis acutis, leviter prominulis, alis separatis, acutis, vix remotis. Labrum antice truncatum. Palpi maxillares articulo apicali penultimo quadruplo longiore, intus dilatato. Prothorax elongato-quadratus, angulis posticis haud dentatis. Pronotum laxe, postice utrinque levissime lineatim punctato-impressum, basi laterale subtilissime punctulata, sulco anteriori medio interrupto. Elytra usque ad apicem fortiter punctato-striata, interstitio 3° juxta striam 3^{ra} quadripunctato, interstitio 8° basin non attingenti. Corpus subtus grosse sed sparse punctatum; sternum lobo intercoxali haud marginato, antice angustissimo. Tibiae antice sulcate, extus bidigitate atque unidentatae, intermediæ calcaratæ. Long. 5 mill.*

Entre Luang-Prabang et Theng (Laos) (M. Pavie).
Se range dans le voisinage du *C. Helferi* Putz.




Fig. 2. — *Clivina parallela* Lesne.

3. **Clivina Julieni** n. sp. — *Elongata, parallela, subcylindrica, sat nitida, castanea, mandibulis basi, palpis, articulo 1° antennarum pedibusque intermediis et posticis dilutioribus. Caput supra subtiliter ac dense rugatum, sutura frontali valde impressa, sovea frontali nulla. Clypeus truncatus, angulis acutis, leviter prominulis, alis separatis apice rotundatis, haud remotis. Labrum profunde emarginatum. Prothorax elongato-quadratus, angulis posticis haud dentatis. Pronotum antice ad margines subtiliter rugatum, disco partibusque posterioribus irregulariter punctatis, sulco marginali anteriori profunde impresso, integro. Elytra postice leviter dilatata, usque ad apicem fortiter punctato striata, interstitiis laevis, nitidis, 3° juxta striam 3^{am} tripunctato, poro 2° ultra medium sito; 7° interstitio antice carinulaformis, 8° basin attingenti. Corpus subitus lateraliter late alutaceum, toto impunctatum (caput exceptum). Prosternum lobo intercoxali antice mediocre angustato, intra coxas marginato. Segmentum ultimum abdominis rugatum. Tibiae anteriores tenuiter sulcatæ, extus bidigitatae et unidentatae; intermediae calcaratæ.* — ♂ Femina minor et nitidior; segmentum ultimum abdominis minus rugatum. — Long. 5 1/2 - 8 mill.

Cochinchine (M. Julien); Cambodge (M. Pavie); Tonkin (M. le Dr Langue).




Fig. 3. — *Clivina alutacea* Lesne.

4. **Clivina alutacea** n. sp. — *C. Julieni proxime affinis, sed latior; differt sequentibus notis : Clypeus angulis carinatis, minute dentiformibus. Prothorax quadratus, levissime transversus. Pronotum disco partibusque posterioribus toto subtilissime rugatum. Elytra omnino alutacea, striis tenuiter punctatis, minus impressis, interstitio 3^o juxta striam 3^{am} quadriporoso, poro 2^o ante medium sito. Corpus subitus latius alutaceum. Long. 7 1/2 - 8 mill.*
Cochinchine (M. Julien); Cambodge (M. Pavie).




Fig. 4. — *Clivina mekongensis* Lesne.

5. **Clivina mekongensis** n. sp. — *Præcedenti sat affinis; differt sequentibus notis : Corpus depresso, haud alutaceum, colore dilutiore. Caput*

supra minutissime rude, sutura frontali nulla, fovea media frontali obsoleta. Clypeus angulis quam in C. alutacea minus prominentibus, alis vix separatis, quadrate angulatis. Alae exteriore magnae, late rotundatae. Labrum antice truncatum. Prothorax quadratus, lateribus fere rectis, paulum arcuatis, angulis posticis levissime dentatis. Elytra basi leviter emarginata, striis obsolete punctatis, ad apicem minus impressis, interstitiis subtilissime transverse rugulatis, interstitio 3^e quadriporoso, poris tribus primis prope striam 3^am, ultimo juxta extremitatem striæ 2^e sitis. Corpus subtus sat nitidum. Segmentum ultimum abdominis lave. Tibiae antice sulcate, extus bidigitatae sed non dentatae. Long. 7 1/2 mill.

Bords du Bas-Mékong (M. le D^r Harmand); Cambodge (M. Pavie).

G. **Megaloodes** n. g. (Trib. *Oodinæ*). — *Corpus ovatum. Sutura frontalis vix impressa. Clypeus omnino impunctatus, poris setiferis deficientibus. Antennæ sat graciles, basem prothoracis fere attingentes, articulo 3^e sequentibus paululum longiore. Labrum transversum, leviter emarginatum, antice triporosum. Mentum profunde emarginatum, sinu medio breve et obtuse dentato. Ligula carinata, paraglossis longioribus. Palpi labiales articulo 3^e glabro. Prothorax antice fortiter, postice leviter angustatus, lateribus arcuatis, sulculo lateralí marginali ante basin expuncto, angulis posticis late rotundatis humeris nullo modo applicatis, impressionibus basilaribus obsoletis, lăvibus. Elytra ovata, humeris rotundatis, interstitio 3^e haud poroso. Prosternum lobo intercoxali apice immarginato, rotundato. Mesosternum late et profunde canaliculatum. Metasternum episternis longioribus quam latioribus. Segmentum ultimum abdominis utrinque lobatum, lobis reflexis supra aperte conspicuis. Pedes mediocres femoribus glabris. — ♂ Tarsi antici articulis tribus primis dilatatis, subtus dense pilosis, 1^o articulo subtriangulari, elongato, 2^o quadrato, 3^o elongato, apice angustato.*

Le genre *Megaloodes* appartient aux *Oodinæ* typiques. La forme arrondie du prothorax dans la région de ses angles postérieurs, l'absence de pores sétigères sur l'épistome et la conformation du dernier sternite apparent de l'abdomen sont ses particularités d'organisation les plus caractéristiques. Les poils de revêtement manquent tout à fait et le système des soies tactiles est lui-même remarquablement réduit.

6. **Megaloodes politus** n. sp. — *Elongato-ovatus, niger, politus, glaber. Caput et prothorax supra laves, impunctati. Pronotum paulo transversum, usque pone medium dilatatum deinde leviter angustatum, disco modice convexo, angulis posticis late triangulariter depresso; sulculo marginali anteriori medio expuncto, linea dorsali tenuissima, utrinque abbreviata. Elytra tenuissime striata, striis lăvibus, prope basin leviter punctatis, interstitiis planis, lăvibus; stria suturali postice profunde impressa, 6^a abbreviata, 7^a obsoleta. Striola scutellaris bene explicata. Corpus subtus lateraliter tenuissime coriaceum. Long. 15 1/2 — 16 mill.*

Siam (M. Bocourt); Chantaboun à Battambang (Siam cambodgien) (M. Pavie). — 2 ind. ♂.




Fig. 5. — *Megaloodes politus* Lesne.

7. **Rhembus lœvis** n. sp. — *R. latifronti* Dej. *sat vicius*, *sed major*.
Corpus antice angustiore, omnino uigrum, nitidum, articulis ultimis 8 antenorium rufo-brunneis. Caput magnuu, lœve, antice late depresso, sulcis frontalis obsoletis; clypeo breviter semicirculare emarginato; labro asymetrico, quam in R. latifronte minus emarginato; mandibulis crassioribus, scrobibus lateralibus latitudine sesquilocngioribus; palpis gracilioribus. Prothorax angustior, minus convexus, lateribus postice sinuatis, angulis posticis




Fig. 6. — *Rhembus lœvis* Lesne.

evidenteribus. Pronotum marginæ laterali crassiore, impressionibus posterioribus majoribus. Elytra tenuissime punctato-striata. Segmentum ultimum abdominis poris setiferis 2 (♂) seu 4 (♀) notatum. Long. 20-22 mill.

Bangkok (Le P. Larnaudie); Chantaboun à Battambang (Siam cambodgien) [M. Pavie]; Meuwen Bay (Java) [MM. M. Maindron et A. Raffray.]

8. **Hypolithus** [*Coleolissus?*⁽¹⁾] *biseriatus* n. sp. ♂. — *Oblongo-ovatus, glaber, nitidus, nigro-brunneus, elytris leviter viridescentibus, palpis, antennis, pedibus prothoracisque margine laterali testaceis. Caput omnino lave; oculi magni, prominentes; antennae graciles, marginem posteriorem prothoracis longe superantes, articulis 3-4 aequilongis; palpi articulo apicali gracile fusiformi; mentum sinu edentato. Prothorax elytris angustior, lavis, nitidus, lateribus curvatis, antice modice dilatatus, postice subrecte angustatus, angulis posticis obtusis, apice rotundatis, basis versus angulos late deppressa, ibique surda, obsoletissime punctulata. Elytra subovata, postice vix dilatata, valide striata, interstitiis subtilissime punctulatis, 3° et 5° prope strias seriatim punctatis, 7° antice unipunctato. Tibiae anticae extus inermes; femora postica poris setiferis 2 remotis. Tarsi anticae articulis 4 primis modice dilatatis, triangularibus, 1° articulo leviter elongato. Long. 10 mill.*

Cambodge (M. Pavie). — 1 ind. ♂.




Fig. 7. — *Liodaptus longicornis* Lesne.

9. **Liodaptus longicornis** n. sp. — L. birmano Bates⁽²⁾ *affinis sed minor, parallelior, minus convexus, colore magis iufuscato. Brunneus, vertice medio, thoracis margine laterali angusta, elytrorum circuitu et sutura appendicibusque testaceis plus minusve obscuratis. Caput quam in L. birmano minus, oculis minoribus, antennis postice basem prothoracis superantibus. Prothorax latior, minus convexus, postice minus angustatus, angulis posticis minus rotundatis. Long. 6 mill.*

Entre Luang-Prabang et Theng (Laos) (M. Pavie). — 1 ind.

⁽¹⁾ Bates, *Ann. Mus. Genov.*, 1892, p. 339.

⁽²⁾ *Ann. Mus. Genov.*, 1889, p. 102.

10. **Brachinus Paviei n. sp.** — *Sat gracilis*, B. exquisito Bates⁽¹⁾ affinis, differt elytris omnino pubescentibus, solum 7-costatis, costa 7^a antice indistincta. Caput et pronotum omnino rufo testacea. Elytra cœruleo-obscura, macula antecapitali obliquiter elongata. Long. 10 mill.

Cambodge (M. Pavie). — 1 ind.

*LISTE DES COLÉOPTÈRES APPARTENANT AUX FAMILLES DES DYTISCIDÆ,
GYRINIDÆ ET HYDROPHILIDÆ RECUEILLIS EN INDO-CHINE ET OFFERTS
AU MUSÉUM PAR M. PAVIE,*

PAR A. RÉGIMBART.

Dytiscidæ.

1. **HYDROVATUS ATRICOLOR** Regb. — Cambodge.
2. **HYDROVATUS SUBTILIS** Sh. — Cambodge.
3. **HYDROCANTHUS INDICUS** Weh. — Siam.
4. **LACCOPHILUS OBTUSUS** Sh. — Luang-Prabang à Theng.
5. **COPELATUS TENEBROSUS** Regb. — Siam.
6. **SANDRACOTTUS HUNTERI** Sh. — Luang-Prabang à Theng.
7. **CYBISTER LIMBATUS** Aubé. — Cambodge.
8. **CYBISTER GUERINI** Aubé. — Luang-Prabang à Theng.
9. **CYBISTER RUGOSA** M. L. — Cambodge.
10. **CYBISTER DEHAANI** Aubé. — Siam.
11. **CYBISTER TRIPUNCTATUS** Ol. — Cambodge.
12. **HYDATICUS BIHAMATUS** Aubé. — Luang-Prabang à Theng.

Gyrinidae.

13. **DINEUTES SPINOSUS** Fab.
14. **PORRHORRHYNCHUS MARGINATUS** Cost. — Luang-Prabang à Theng.
15. **ORECTOCHILUS SUBLINÉATUS** Regb. — Luang-Prabang à Theng.
16. **ORECTOCHILUS SPINIGER** Regb. — Cambodge.

Hydrophilidæ.

17. **HYDROPHILUS HASTATUS** Herbst — Luang-Prabang à Theng.
 18. **HYDROPHILUS CASCHMIRENSIS** Redt. — Siam.
 19. **STENOLEPHUS RUFIPES** Fab. — Luang-Prabang à Theng.
 20. **PHITHYDRUS ESCURIENS** Walk. — Siam.
 21. **BEROSUS SP. (PROPE PUBESCENS)** Muls. — Siam.
 22. **VOLVULUS ÆNEUS** Brullé. — Siam.
 23. **SPHERIDIUM QUINQUE MACULATUM** Fab. — Cambodge.
-

⁽¹⁾ *Ann. Mus. Genov.*, 1892, p. 394.